

Отдел исследований системы гемостаза, тел. (3822) 909-740

Подготовка к исследованию: пробирка с голубой крышкой

Коагулограмма, агрегация тромбоцитов: детям до 1 года не есть в течение 30-40 минут до забора крови, детям в возрасте 1-5 лет не есть в течение 2-3 часов до забора крови, детям старше 5 лет и взрослым не есть в течение 12 часов до забора крови, воду пить можно. Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение, курение в течение 30 минут до исследования.

Агрегация тромбоцитов, дополнительно: в течение 7 дней до исследования исключить прием лекарственных препаратов, особенно НПВС (проконсультироваться с врачом).

Коагулограмма

- A12.05.027.001 АЧТВ
- A12.05.027 Протромбиновое время +МНО
- A09.05.050 Общий фибриноген
- A09.05.051.004 РФМК
- A09.05.047 Антитромбин III
- A09.20.003.001 Д-димер
- A09.05.188 Активность фактора VIII
- A09.05.187 Активность фактора IX
- A12.05.049 Активность ингибитора фактора VIII
- A12.05.050 Активность ингибитора фактора IX
- A09.05.186 Активность фактора X
- A09.05.185 Активность фактора XI
- A09.05.184 Активность фактора XII
- A09.05.190 Активность фактора V
- A09.05.189 Активность фактора VII
- A12.05.035 Активность фактора Виллебранда
- A09.05.220 Антиген фактора Виллебранда

ОГАУЗ «Областная детская больница»

г. Томск, пр. Кирова, 14а

office@odb.tomsk.ru

Фамилия _____

Имя _____ Отчество _____

Пол жен, муж. Дата рождения ____/____/____

Код диагноза _____.

Врач _____

Отделение _____

№ направления _____ Дата ____/____/____

ЛПУ, выдавшее направление _____

СРОЧНО ПЛАТНО

Для посещения процедурного кабинета необходимо получить талон в инфомате на 1 этаже

Отдел исследований системы гемостаза, тел. (3822) 909-740

Подготовка к исследованию: пробирка с голубой крышкой

Коагулограмма, агрегация тромбоцитов: детям до 1 года не есть в течение 30-40 минут до забора крови, детям в возрасте 1-5 лет не есть в течение 2-3 часов до забора крови, детям старше 5 лет и взрослым не есть в течение 12 часов до забора крови, воду пить можно. Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение, курение в течение 30 минут до исследования.

Агрегация тромбоцитов, дополнительно: в течение 7 дней до исследования исключить прием лекарственных препаратов, особенно НПВС (проконсультироваться с врачом).

Гормоны

- A09.05.065.001 ТТГ
- A09.05.063 свободный Т4
- A09.05.135 общий кортизол

Витамины

- A09.05.235 25 (ОН) витамин Д

Исследование индуцированной агрегации тромбоцитов

- A12.05.017.004 с АДФ
- A12.05.017.005 с ристомицином
- A12.05.017.006 с коллагеном
- A12.05.017.007 с адреналином